Тетраодончики и другие иглобрюхие

Первое знакомство с тетраодончиками у меня было заочным – прочитал о них в книгах Н.Ф.Золотницкого и у М.Д. Махлина. Импорта аквариумных рыб в СССР тогда практически не было, а привозили их настоящие аквариумисты-фанатики - полулегальным путём. Поэтому живыми их мне довелось впервые увидеть в 1969 у московского аквариумиста Анатоля Ивановича Ножнова. Это был зелёный тетраодон – тогда его научное название было – Tetraodon fluviatilis, что можно перевести, как четырехзубец речной. Сейчас всё поменялось и продолжает меняться. Я уже об этом неоднократно писал.

Развести их вопреки всем ожиданиям так и не удалось. Рыбка оказалось сложной. Первое успешное разведении е тетраодонов выпало на долю Михаила Ивановича Лихачёва в середине 1970-х, но это уже был другой вид – Tetraodon leiurus brevirostris, который попал к нам под названием T.cutcutia.

Все тетраодоны относятся к семейству Tetraodontidae – систематическое положение этого семейства непростое, видов и родов много, и я не буду здесь останавливаться на вопросах классификации. Желающие могут всё, что их интересует посмотреть **в моей книге «Современный справочник аквариумиста»** вышедшей 5 лет назад. Единственно скажу о том, что это семейство иглобрюхих четырёхзубцев. И иголочки на брюшке и зубки можно разглядеть на фотографиях.

Отмечу сразу, что рыбы при агрессии и испуге способны надуваться и воздухом и водой, но это вызывает стресс и сокращает их и так недолгую жизнь. Добавлю ещё, что обитают тетраодоны, как в пресной, так и солоноватой и морской водах.

В самом начале 1970-х мне подарили сразу 2 вида тетраодонов из Тайланда, которых ранее относили к родам Chonerinos и Carinotetraodon. История очень интересна и я не могу рассматривать её **по отношению к себе иначе, как чудо.** Когда-то давно, ещё при жизни Михаила Николаевича Ильина, автора книги "Аквариумное рыбоводство" и председатель МГКА один из КЮБЗовцев (КЮБЗ -Клуб Юных Биологов Зоопарка - московского) пообещал привезти интересных рыб из-за границы, когда вырастет. Пока он рос, Ильин умер, но мальчик вырос, занял в жизни определенное место и выполнил своё обещание. Привёз рыб прямо из Тайланда. Звали его Владислав Александрович. Фамилии я, к сожалению не запомнил. Когда рыбы уже были в Москве, никто не знал, что с ними делать и обратились ко мне лично, как преемнику клубных традиций. В то время я был заместителем председателя МГКА по международной работе, так как хорошо знал аквариумное дело и ещё мог хоть как-то говорить по-английски и немецки. Вот так и попал ко мне крошечный красноглазый тетраодон прямо от экспортёра **"Somphongs Aquarium"**. Однако несмотря на все предпринимаемые усилия развести их не удалось. На фото самка этого красноглазого тетраодона – фотографии почти 40 лет.

Спустя приблизительно 15 лет я увидал в ГДР разведённых Carinotetraodon somphongsi (сейчас это C. lorteti) и приобрёл ещё 6 штук. Рыбы прекрасно выросли и стали нерестится, но выкормить ни одного малька так и не удалось. Вили Иохер в своей книге "Spawning problem fishes" 1972 года об этом писал и рекомендовал давать молоди растёртых энхитрей, но в нашем случае это не помогло. – Никакой корм мальки не брали и создалось впечатление, что у них у всех была врожденная деформация челюстно-ротового аппарата.

Позднее в 1990-е годы было завезено много интересных видов, но развести удалось только 3.

На фото можете увидеть окраску крошечного малька нильского фахака (Tetraodon fahaka) и сравнительно крупной особи. А в прилагаемом видео показаны все метаморфозы окраски молоди по мере роста.

ВИДЕО Tetraodontidae - breeding results HD/ Размножение тетраодонов

Предлагаю Вашему вниманию также фрагмент годового отчёта программы WCTAB, относящийся к разведению тетраодонов. Десять лет, как программа не существует, а её результаты актуальны и цитируются по всему миру. Полностью отчёт можно увидеть на страничке моего сайта

www.писатель-аквариумист.рф

Ambassadors of Nature: Summary Report # 6

"Wildlife conservation through aquarium breeding"

Species	Average fecundity	Maximal fecundity	Eggs development			Young growing rate (1 month age)	Minimal breeder's size	Notes
	(thousand eggs)	(thousand eggs)	size, mm (swollen)	hatching time, hours	T, Celsius	cm	cm	
XI. TETRAODONTIDAE								
1. *Tetraodon cutcutia*	0.7-0.8	1.2	1.5	170-180	28	1.2	8-9	7
2. *T. fahaka*	4	6	1.5	60-72	29	0.5-0.6	28	5, 10, 11
3. *T. leiurus brevirostris*	0.2-0.3	1.5	1.5	180	28	1.5	10	8, 11, 14