Кормление соответственно природным особенностям

Кормление соответственно природным особенностям

Основа подготовки рыб к размножению заключается в разнообразном кормлении соответственно требованиям каждого вида рыб. Начиная с малькового возраста, необходимо обеспечить рыб сбалансированной диетой, то есть полным набором аминокислот, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ - макро- и микроэлементов. Причем, следует принимать во внимание, что по мере достижения половой зрелости, а также в периоды пред нерестовых игр, набора икры и молок, после нерестового "отдыха" и т.д., характер питания должен меняться.

Кормление только, казалось бы натуральными, живыми кормами - мотылем, трубочником, дафнией, циклопом и т.д. подчас не только не решает проблем, но и не рекомендуется, так как таит в себе опасность заражения дорогостоящих рыб-производителей болезнями. Разработанные, специально для аквариумных рыб сухие сбалансированные корма, с различным содержанием белков, жиров и углеводов подходят, как основа питания будущих производителей в случае их правильного чередования и комбинирования со специально приготовленной и замороженной пищей (см. выше рецепт). Необходимым элементом диеты, как растительноядных, так и плотоядных рыб служит витаминная растительная подкормка в виде листьев салата, шпината, сельдерея, петрушки и т.п. или мягких листьев подходящей водной растительности (гигрофилы, кабомбы, лимнофилы), помещаемых в аквариум периодически. Вообще же, если рыбы в аквариуме вдруг усиленно принимаются за уничтожение растений, это часто означает, что в их рационе не хватает витаминов и микроэлементов.

Опыт показывает, что для адекватного питания цихлид-моллюскоедов (например, цифотиляпий) можно использовать морепродукты - мясо кальмара, морского гребешка, креветок и т.д. В качестве витаминной добавки необходимо перетереть морепродукты с паприкой (высушенным сладким красным перцем), добавляя ее до светло-оранжевого окрашивания смеси.

Чередование и правильная смена кормов стимулируют нерест сами по себе и, как отмечает автор, обогащение диеты крупным (не мелким !) озерным мотылем и весенним красным циклопом помогает инициировать нерест рыб в трудных случаях.

Кроме того, присутствие в воде мельчайших планктонных организмов, которых взрослые рыбы не в состоянии употреблять в пищу (они "проскакивают" через жабры), также в ряде случаев может стимулировать нерест. По-видимому, этот планктон каким-то образом "дает сигнал" взрослым об изобилии корма для будущего потомства.